

กัญชาใช้รักษาอะไรได้บ้าง

- คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด
- อาการชัก ที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้
- ปวดจากเส้นประสาท กล้ามเนื้อหดเกร็งที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้

โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา

- โรคพาร์กินสัน
- โรคอัลไซเมอร์
- โรควิตกกังวล(GAD)
- โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ(ที่ไม่ใช่ปลอกประสาทเสื่อมแข็ง)
- ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
- ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง
- โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ว่าน่าจะได้ประโยชน์

* ไม่แนะนำ ให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเบื้องต้น หากใช้ควรเริ่มจากปริมาณที่น้อยที่สุด (เช่น น้ำมันกัญชาควรเริ่มจากปริมาณเท่าปลายไม้จิ้มฟันก่อน) แล้วค่อยเพิ่มปริมาณมากขึ้นทีละน้อย

อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา

อาการที่ควรลดขนาดการใช้

- มึน/เวียนศีรษะ
- ร่างกายเสียสมดุล
- หัวใจเต้นเร็วขึ้น/ช้าลง
- ความดันโลหิตผิดปกติ(สูง/ต่ำกว่าปกติ)

อาการที่ควรหยุดใช้

- สับสน
- กระวนกระวาย
- วิตกกังวล
- ประสาทหลอน
- โรควิต



ผู้ใช้กัญชา/สารสกัดกัญชา

× ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ



× ไม่ควรทำงานกับเครื่องจักรกล



ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชาที่มี THC เป็นส่วนประกอบ

- มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาหรือตัวทำละลายที่ใช้สารสกัด
- เป็นโรคหัวใจ ที่ไม่สามารถคุมอาการได้
- เป็นโรคจิตมาก่อน เป็นโรคอารมณ์แปรปรวนหรือ โรควิตกกังวล
- สตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร/วัยเจริญพันธุ์ไม่คุมกำเนิด หรือสตรีมีครรภ์ที่มีแผนตั้งครรภ์
- ผู้ป่วยเด็กที่ใช้สารสกัดกัญชา(อายุต่ำกว่า 25 ปี) จะส่งผลเสียในระยะยาวต่อพัฒนาการสมองทำให้ชาวปัญญาลดลง



ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยกัญชาได้อย่างไร

ผู้ป่วย → ผ่านสถานพยาบาล(ยส.5) → แพทย์
ผ่านการอบรม/รักษาด้วยวิธีอื่น(กัญชาไม่ใช่
ตัวเลือกแรกในการใช้รักษาโรค) → จ่าย
ผลิตภัณฑ์กัญชา(ที่ได้รับจากสถานที่ผลิต
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)



การดูแล/รักษาอาการเมากัญชาเบื้องต้น

- หยุดใช้กัญชา อาการจะดีขึ้นในอีก 2-3 สัปดาห์
- ดื่มน้ำ ของหวาน ผลไม้ เช่น อ้อย มะนาว
- อาบน้ำอุ่น / ทาเจลพริก ทำให้หลอดเลือดบริเวณผิวหนังขยายตัว
- หากอาการไม่ดีขึ้นให้มาพบแพทย์ (ไม่ปิดบังสาเหตุที่มาพบ)

ระวัง!! ปัญหาต่อกัน

- กลุ่มยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา (Clarithromycin, Ketoconazole, Ritonavir) ใช้ร่วมกัน : หัวใจเต้นเร็ว ชัก ความดันสูง ปวดศีรษะ
- ยารักษาโรคหัวใจ ลดความดัน(เช่น Amiodarone, Diltiazem, Verapamil, Atenolol, Propranolol เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน : ความดันต่ำ ช็อก
- ยาลดไขมัน (เช่น Simvastatin, Atorvastatin เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน : ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือน้ำตาล
- ยาจิตเวช (เช่น Fluoxetine, Sertraline, Amitriptyline เป็นต้น) ใช้ร่วมกัน : หัวใจเต้นเร็ว หรือผิดจังหวะ กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง เคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ
- ยากันชัก(Phenytoin, Topiramate, Rufinamide) ใช้ร่วมกัน : ตากระตุก เดินเซ สูญเสียการรับรู้ตอบสนอง อาจเสียชีวิต
- ยาอื่นๆ เช่น Warfarin ใช้ร่วมกัน : เลือดออกผิดปกติ เช่น มีจ้ำเลือดที่ผิวหนัง ไอเป็นเลือด ปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือด เป็นต้น

กัญชา

ทางการแพทย์



- × ไม่สามารถซื้อสารสกัดกัญชาใช้เองผิดกฎหมาย
- × กัญชาไม่ใช่ยาครอบจักรวาล

โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

กระทรวงสาธารณสุข